Siltor

Sulphur 80% WDG

(Contact Fungicide)

It is a water dispersible granules containing 80% sulphur as active ingredient and balance adjuvants 20% w/w.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of diseases	Dosages / Ha A.I (Kg)	Formulation (Kg)	Dilution in (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
GRAPES	POWDERY MILDEW	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
APPLE	POWDERY MILDEW	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
COWPEA GUAR, PEA	POWDERY MILDEW	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
CUMIN	POWDERY MILDEW	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
MANGO	POWDERY MILDEW	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	

Direction Of Use : Sulphur is not recommended for application on sulphur "shy" vegetables e.g. cucurbits etc. and certain variety apples, pears and other fruits where high temp (85 deg F or 30 deg. C) prevail sulphur will be phytotoxic.

Plant Protection equipment: Knapsack sprayer, Foot sprayer, Compression Knapsack sprayer with flat fan / flood jet nozzle.

Precaution:

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.

Phytotoxicity:

The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms of Poisoning:

Nausea, vomiting, headache and irritation to the bronchii, eyes and lungs may occur.

First Aid :

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote :

No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

Disposal Of Used Container :

1. Empty containers shall be broken & buried away from habitation.
2. The used containers or packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. Packages or surplus material & washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Condition :

1. The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms of premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under key and lock depending upon the quantity and nature of the material.
2. The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contaminated with vapour.

Chemical Composition :

Sulphur a.i.		80.000% W/W
Dispersing agent	sodium salt of phenol sulphonic acid condensate	8.000% W/W
Wetting agent	sodium salt of alkyl naphthylene sulphonic and aromatic sulphonic acid condensate	2.000%W/W
China clay / kaolin	QS to makes 100	
Total		**100.000 % w/w**

Caution : Not to be used on Crops Other Than Specified on this leaflet.

सिलटौर

सल्फर ८० प्रतिशत पानी में घुलनशील दानेदार

(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

यह एक सल्फर ऑक्सिलेन्ट में बनाया गया दानाहै जिसमें भार के हिसाब से ८० प्रति. सल्फर तथा है। इसका उपयोग फसलों पर स्प्रेयरों की सहायता से किया जाता है।

उपयोग

फसल	रोग के नियन्त्रण हेतु	प्रति हेक्टेयर मात्रा			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
		स. तत्व (कि. ग्रा.)	सांद्रण (कि. ग्रा)	पानी की मात्रा (लि.)	
अंगूर	चूर्णी फफूंदी	१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
सेब	पाउडरी	१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
किया गवार मटर	चूर्णी फफूंदी	१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
जीरा	चूर्णी फफूंदी	१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
आम	चूर्णी फफूंदी	१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	

उपयोग के लिये निर्देश : इसका उपयोग सल्फर से गुलाबी होने वाली सब्जियों जैसे कुष्मांड कुल की सब्जियों अथवा किस्मों तथा, नासपाती व अन्य फलों की कुछ किस्में जहां पर तापमान ८५ डिग्री फारेनहाइट या ३० डिग्री से.ग्रे. या अधिक होता है हानिकारक होता है।

उपयोग की मात्रा – सल्फर ८० प्रति. चूर्ण रखने वाले पानी में घुलनशील कवक है जिसमें सल्फर ८० प्रति. पाया है तथा बाकी सक्रिय तत्व है। कवक का आकार २ से ४ माईक्रॉन होता है। इस कारण फसलों की सतह पर सक्रिय तत्व का स्थायित्व बना रहता है जिससे फंगस ज्यादा असरदार होते हैं। सीधी चलने वाले पंप या लम्बवत चलने वाले पिस्टन पंप को प्रयोग करें। पंप द्वारा बारिक बंध का प्रयोग भी किया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन को बच्चों से चारों से दूर रखें। २. मुंह, नाक और आंखों के संपर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में पेस्टिसाइड करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

पौध विषाक्तता : सुझाव की गयी मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह सिंचनात्मक पौधविषाक्त नहीं है।

विषाक्त लक्षण : जलन्ध्र मन, उल्टी आना, सिरदर्द और श्वसनीनलीयों, आंखों में तथा फेफड़ों में जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाएं तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकाला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएं। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को साबुन मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखें दूषित हो जाएं तो उनको खारे पानी में लगभग १० से १५ मिनट तक धोएं।

४. यदि सांस द्वारा अन्दर श्वास ले ली हो तो तुरन्त स्थान ले जायें।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बे का निपटान : १. फफूंदनाशक निर्माता का उपयोग कवक का कर्तव्य है कि डिब्बे या पात्रों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २. प्रयोग किये गये डिब्बे को दुबारा प्रयोग के लिये बंद सुरक्षित रखें। ३. डिब्बों या बचे हुए कृषक रसायन या धोवन का निपटान इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की जैविक, वैज्ञानिक पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. फफूंदनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या अलमारी में ये कि अन्य सामग्री तथा खाद्य सामग्री से जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किये जाते हैं उन से दूर तथा ताला चाबी में फफूंदनाशक के प्रयोग के आधार के हिसाब से अलग अलग अलमारियों में रखना चाहिए। २. जिस जगह या अलमारी में फंगनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी जगह में बीटनाशक का भंडारण करने के वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, अच्छा धुप, हवादार व आकार में पर्याप्त तथा चौड़ा होना चाहिए। ताकि सिटनाशक के पानी के वाष्पकण दूषित न हों।

रासायनिक संगठन :

सल्फर तत्व		८०.००० % भार/भार
डिस्पर्सीबल एजेन्ट	सोडियम लवण ऑफ फिनोल सल्फोनिक एसिड कंडेन्सेट	८.००% भार/भार
वेटिंग एजेन्ट	सोडियम लवण ऑफ एल्किल नेफ्थेलिन सल्फोनिक एसिड एवं एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड कंडेन्सेट	२.००% भार/भार
चाइना क्ले / कयोलिन	क्वॉटवन	
योग:		१००.००० % भार / भार

सावधान : इस सीमांत में दी गई सलाह से अलग किसी भी अन्य फसल पर इसका उपयोग न करें।

सिलटौर

सल्फर ८०% डब्ल्यूडीजी

(संपर्क फंगिसाईड)

है जगह विषाक्तकारक रसायन अवशेष तथा ८०% सल्फर सक्रीय घटक मात्रायुक्त अपने कारी अनुपातिक २०% डब्ल्यू/डब्ल्यू

सिफारिशी

पीक	लगाये जाने वाले नाम	कीटक/डिसीज				सक्रिय कणाणी प्रति एकाणी प्रतीन घट सहायक सल्फायर (किलोग्राम)
			ए.आय (ग्रैम)	मिश्रण (लि.)	तुरन्त मिश्रण करने (लि.)	
द्राक्ष	भूकी		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
सफरजन	स्कॅब		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
वोगी, गवार, चवळा	भूकी		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
जीरा	भूकी		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
आंबा	भूकी		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	

उपयोग करण्याविषयी सूचना : सल्फरसुद्धे दुष्परिणाम होत आहेत्या काऱ्यांना सल्फरचा उपयोग न करायची शिफारस करण्यात येत आहे जसा. कुकुरबिटस वरि प्रांती ठराविक प्रातांची सफरजन, पियर्स, आणि इतर फळे, तेथे काय तापमान असते (८५ डिग्री फॅ किंवा ३० डिग्री से.) असा ठिकाणी सल्फर फायटोटॉक्सिक होईल.

पीकाची वाढ्दी : १. अन्नपदार्थ, रिकामी अन्नाची पत्रे आणि प्रत्यांचे साठा वातावरणापासून देवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क येऊ देऊ नका. ३. फवारा करताना हात जरूर धुवा. ४. फवारा दिलेले स्वच्छ करावे. ५. सल्फरस्त कपडे आणि शरीराचे अवयव स्वच्छ करून स्वच्छ धुवा. ६. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, खाणे पिणे, खाणे आणि चघळू नका. ६. निवडा आणि स्वच्छ्याकालत संपूर्ण संरक्षक कपडे घाला.

फायटोटॉक्सिसिटी : शेतातील शिफारशीनुसार उपयोग केल्यास हे उपयोग फायटोटॉक्सिक नाही.

पीक संरक्षण उपकरणे: नॅपसॅक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, पाल्म कॅन/फ्लड नेट नोझलसह कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर

प्रथमोपचार : १. विषारण: प्रमाण बेट अचूक उलटी करण्यास लावा. उलटी स्पष्ट होईपर्यंत असे करा रहा. रुग्ण बेहुद असल्यास उलटी लावण्यास सांगू नका. २. जर कपडे आणि त्वचेला संसर्ग झाला असेल तर क्षेत्र साबण आणि भरपूर पाणी असलेल्याने संसर्गाझालेले त्वचा धुवा. ३. जर डोळ्यांना संसर्ग झाला असेल तर भरपूर सलाइन/स्वच्छ पाण्याने १० ते १५ मिनिटे सारखे धरा. ४. श्वासाद्वारे आत गेल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत न्यावे.

उतारा : याचा कोणतेही उतारा माहिती नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : १. रिकामे कंटेनर तोडावेत आणि जमीनीखाली पुरावेत. २. रिकामे कंटेनर व पॅकेजेस पुन्हा उपयोग केल्या जाऊ नये म्हणावी ती बाहेर फेकून देऊ नयेत. ३. पॅकेजेस किंवा उरलेल्या पात्र व धुतलेले पाणी योग्य पर्यावरणाचे आणि पाण्याचे प्रदुषणाकरिता परीक्षाकरी पद्धतीने विल्हेवाट लावावी.

साठवणीची स्थिती : १. साठ असलेले जीवनेत साठा खोलीत किंवा वस्तूत इतर वस्तू साठविण्यापासून, साठा करण्या उपयोगासाठी बाजूच्या ठेवण्यापासून वेगळा साठवा किंवा वस्तूसाठा दूर ठेवावेत किंवा स्वतंत्र कुलुपबंद कपाटात गरजेचे प्रमाण व स्वरूप हानुसार ठेवावेत. २. मात्र ठेवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा वस्तू संगण्य बांधलेल्या, चांगल्या प्रकाश असलेल्या आणि योग्य वायूवीजन असलेल्या आणि पुरेशा आकारमानाच्या असल्याचा उद्देशाचे प्रभाव टाळणे नसते.

रासायनिक विभाग :

सल्फर २ आय.		८०.००० %डब्ल्यू/डब्ल्यू
डिस्पर्सायन एजन्ट	सिनॉल सल्फोनिक ॲसिड कन्डेन्सेटो सोडियम सॉल्ट	८.००० % डब्ल्यू/डब्ल्यू
भिजविणारे साधन	ॲल्किल नॅफ्थलिन सल्फोनिक आणि ॲरोमॅटिक सल्फोनिक ॲसिड कन्डेन्सेटो सोडियम सॉल्ट	२.००० %डब्ल्यू/डब्ल्यू
चायना क्ले/कयोलिन	२०० क्वॉटवनसारी वापरून	
एकूण		१००.००० %डब्ल्यू/डब्ल्यू

सावधानी : हा माहिती फीडबेक व्यतिरिक्त सलाह विषयाशिवाय अन्य पीकासाठी वापरू नये.

सिलटौर

सल्फर ८०% डब्ल्यू.डी.जी.

(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

आ पण प्रमाण दाणाओ ते, जेथे सक्रिय घटक तरिके ८०% सल्फर असे वाहीना सहायिकी २०% डब्ल्यू/डब्ल्यू ते.

वापरासाठी:

पीक	निवडावाचे नाव	कीटक/डिसीज				सक्रिय घटकाचे अवशेषाची पातळी (दिवसांत)
			म.ए. (ग्रा)	मिश्रण (लिटर)	प्रमाण मिश्रण (लि.)	
द्राक्ष	पुडी करी		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
सफरजन	पुडी करी		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
वोगी, गवार, चवळा	पुडी करी		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
जीरा	पुडी करी		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	
आंबा	पुडी करी		१.५०-२.००	१.८७५-२.५०	७५०-१०००	

कशी रीते उपयोग करावे : सल्फरची शिफारशी शाकभाजीओ, द.ता. कुकुरबिट्स फळे पर सल्फरची संरक्षण नहीं करता असे ज्यां ठिकाणे तापमान (८५ डिग्री फेरनहाईट अथवा ३० डिग्री सेल्सियस) प्रचलित सल्फर होय त्यां अधुक प्रकारांमां सल्फरचा, पेर अने अन्य फ्रूटो ज्यां टोक्सिक रहेशे.

स्प्रेयर : नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, सम्प्रेर पंपो ए/प SGD फ्रेट नोझल साथेनु कोम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर.

फायटोटॉक्सिसिटी : जो भलामण अनुसार उपयोग करवामां आवे तो आ प्रोडक्ट फायटोटॉक्सिक नथी.

तकेदारी : १. भाडपदार्थो, भाडपदार्थना खाली कन्टेनरो अने पशुना खोराकथी दूर राखो. २. मुख, आंख के त्वचा द्वारा संपर्क टाळो. ३. छंटकाव वेळा श्वासमां न जाय तेनुं ध्यान राखो. पवनानी दिशामां छंटकाव करो. ४. छंटकाव कर्या पछी दूषित कपडां अने शरीरना भागने स्वच्छ पाणीथी धोई काढो. ५. छंटकाव करती वेळा धूम्रपान, पीवुं, भणुंके खावुं नहीं. ६. श्वसन द्वारा लेवा अने छंटकाव करती वेळा रक्षणात्मक वस्त्रो पहेरो.

झेरनी लक्षणो : ऊबकां, उलटी, मा थामां दर्द, ब्रान्काई, आंखो अने झेड़ामां सोजो उद्भवी शके छे.

प्राथमिक उपचार : १. जो गळी झवाय तो गळानी पाछळ हाथेथी हाथेड़ीमां ऊलटी कराव्यी. विरुद्ध साइ थाय त्यां सुधी तेनुं पुनरावर्तन करो. जो दर्दी जेमात होय तो तेने ऊलटी करवा माटे भलपूर नहीं करवुं. २. जो कपडां अने त्वचा दूषित थयां होय तो कपडां काढीनांखी अने त्वचाने भरपूर पाणी अने साबु वडे साइ धोई काढो. ३. जो आंख दूषित थई होय तो लगभग १०थी १५ मिनिट सुधी भरपूर स्वच्छ पाणी छांटीने धुवो. ४. जो श्वासमां ज्यां तो दर्दीने तुरत ताजी हवामां लावो.

एन्टीडोट : ये शिफ्ट एन्टीडोट ज्ञात नथी, लक्षण प्रमाणो उपचार करो.

उपयोग करेला कन्टेनरनो निकाल : १. खाली कन्टेनरो तोडी नाखवा अने मानव वसाहतथी दूर दाटी देवा २. उपयोग करेलां कन्टेनरोने अने पेकेजो ફરીથી ઉપયોગમાં આવી જાય તે રીતે બહાર ખુલ્લામાં રાખવાનું ટાળવું. ૩. પેકેજો, પ્રદાવાની સામગ્રીઓ અને ધોવાણનો કચરો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવો, જેથી પર્યાવરણીય અને જળપ્રદુષણ ટાળે.

संग्रहणची स्थिति : १. सामग्री धरण्यां पेकेजो अन्य सामग्री, मास ऽडीने खाद्य सामग्री राखवी होय तेनाथी अलग रूम के स्टुलमां संग्रह करवो अथवा सामग्रीना प्रकार अने मात्रा प्रमाणे ऽताम ताळा- चाबीथाना कबाटमां राखवां.

२. सामग्रीनो संग्रह करवा माटेनो रूम के स्टुल सारी रीते बंधायेलो होवो जोईये, ज्यां सुकी अने प्रकाशमानी पूरती व्यवस्थावाळी होवी जोईये. वाष्पथी दूषित थवानु टाळवा माटे जगाना परिमाण पूरतुं होवुं जोईये.

रासायनिक विगत :

सल्फर २ आय.		८०.००० %डब्ल्यू/डब्ल्यू
डिस्पर्सिंग एजन्ट	डिनेप्थ लेसीलिक ॲसिड कन्डेन्सेटो सोडियम मीठ	८.००० % डब्ल्यू/डब्ल्यू
वेटिंग ॲजन्ट	ॲल्काईल नेप्थालीन सल्फोनिक अने ॲरोमेटिक सल्फोनिक ॲसिड कन्डेन्सेटो सोडियम मीठ	२.००० % डब्ल्यू/डब्ल्यू
चायना क्ले / कायोलिन		१०० ક્વાટવન ધ્યાન માટે સુધારેલ
કુલ		१००.००० % डब्ल्यू/डब्ल्यू

સાવચેત : આ પત્રિકામાં નિર્દિષ્ટ કરાયા સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ માટે નથી.

For Agricultural Use Only

केवल कृषि उपयोग के लिए।

Read Leaflet Before Use

पूरा पर्चा और लेबल ध्यान से पढ़े

Sulphur 80%WDG

Siltor

Contact Fungicide

सल्फर 80% डब्ल्यू.डी.जी.

सिलटौर

स्पर्शीय फफूंदीनाशक

agrovet

Marketed By :

Godrej Agrovet Limited

"Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai – 400 079

विपणनकर्ता : **गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड,**

"गोदरेज वन", तीसरा माला, पिरोजशा नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली (पूर्व), मुम्बई–400 079

Customer Care No: 022-25194491

e-mail: gavlho@godrejagrovet.com

www.godrejagrovet.com

Manufactured By:

Crop Growth (India) Pvt. Ltd.

D-21 & C-21,22, Sikandrabad Industrial Area, Distt. Bulandshahr-203 205 (U.P.)

निर्माता : **क्रॉप ग्रोथ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,**

डी–२१ एण्ड सी–२१,२२, सिकन्दराबाद इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला बुलंदशहर–२०३ २०५ (यू.पी.)

ਸਿਲਟੋਰ

ਸਲਫਰ ੮੦% ਡਬਲਯੂਡੀਜੀ

(ਖਮਜਰੀ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ)

ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੜਕਣੀਯੋਗ ਕਣਦੇਰਾ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ੮੦% ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ੨੦% ਕਣਕਣ/ਕਣਕਣ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੰਡਾਂਦਾਨੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭ	ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ	ਖੁਰਾਕ/ਐਕੜੇ(ਗ੍ਰਾਮ) ਏਕਾਈ (ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ)	ਗਲਾਸ ਦਾ ਹਲਕਾ (ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ)	(ਲਿਟਰ) ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ	ਵਿਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਇਕ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਤਾਣ (ਮਿਲੀ ਵਿਚ)
ਅੰਗੂਰ	ਪਾਊਡਰੀ ਫੂੰਗੀ	੧.੫੦-੨.੦੦	੧.੭੫-੨.੫੦	੭੫੦-੧੦੦੦	
ਸੇਬ	ਪਾਊਡਰੀ ਪਾਈਨ	੧.੫੦-੨.੦੦	੧.੭੫-੨.੫੦	੭੫੦-੧੦੦੦	
ਚਾਵਲੀ	ਮਟਰ ਪਹਿਲ ਝਲਸੀ	੧.੫੦-੨.੦੦	੧.੭੫-੨.੫੦	੭੫੦-੧੦੦੦	
ਬੈਂਗ, ਖੀਰੇ, ਤੁਰਈ, ਮਟਰ	ਪਾਊਡਰੀ ਫੂੰਗੀ	੧.੫੦-੨.੦੦	੧.੭੫-੨.੫੦	੭੫੦-੧੦੦੦	
ਮੀਰ	ਪਾਊਡਰੀ ਫੂੰਗੀ	੧.੫੦-੨.੦੦	੧.੭੫-੨.੫੦	੭੫੦-੧੦੦੦	

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ : ਸਲਫਰ "ਕਾਲੇ" ਫਫੂਦੀਨਾਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੂ ਕਣੀਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਲੇਸ ਕਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਬਲਾ (੮੫ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਕਾ ਕਿਲੋ ਕੀ) ਦੀ ਲੋਰ ਤੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੇ ਸਲਫਰ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ ਦਾ ਪੂਰਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪੇਟਾਇਓਲੋਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੈ।

ਪੇਟਾ ਪੁਰਤੀਮਾਂ ਉਪਯਤ : ਪੇਸਟੀਸ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੂਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕਰੀਟ ਬੋਰ/ਕਰੀਬ ਬੋਰ ਸਾਧਨ ਕਾਰਨ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸਪ੍ਰੇਅਰ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : ੧. ਤੇਜ਼, ਗੇਲ ਕਾਲੇ ਖਾਣੀ ਘਟਨਾਂ ਅਤੇ ਧੁਪ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਰ ਲਗੇ ੧੨ ਮੂੰਹ, ਕਾਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹਵਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਲੰਕਰ ਦਿਓ। ੨. ਸਪ੍ਰੇ ਮਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਕਰ ਦਿਓ। ੩. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਹਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ੪. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨੇ ਦੇਰਿਆਂ ਤਾਕਰ ਕਰਿਪੀਲ, ਸਾਹਮਣਾਕਰ ਕਰੋ। ਫੂੰਗਿਸ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨੇ ਦੇਰਿਆਂ ਤਾਕਰ ਕਰਿਪੀਲ, ਹੋਰਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰ ਕਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਦੇਰਿਆਂ ਕੋਨ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਿ ਕਾਰ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦੇਕਰ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਾ ਕਿਰੀ।

ਕਾਸਟਿਕ ਕਿਸਮਾਂ :

ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਟੇ		੮੦.੦੦ % ਭਾਰਤੂ/ਭਾਰਤੂ
ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਸਲਫਰ	ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਸਲਫਰ ਕੋਲੋਇਡ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਸਾਫਟ	੮.੦੦ % ਭਾਰਤੂ/ਭਾਰਤੂ
ਏਰਿਸ ਅਕੇਰ	ਘਰਕਾਇਕ ਸਲਫਰਿਕ ਅਤੇ ਐਕੋਇਨ ਸਲਫਰ ਐਸਿਡ ਕੋਲੋਇਡ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਸਾਫਟ	੨.੦੦ % ਭਾਰਤੂ/ਭਾਰਤੂ
ਸੀਰੀ ਸਿਰੀ/ਕਾਰਬਿਲ	੧੦੦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਸਿਰੀ	
ਕੁੱਲ		੧੦੦.੦੦ % ਭਾਰਤੂ/ਭਾਰਤੂ

ਸੁਰਤੇ : ਇਸ ਪਦੇਇਕਿਕਾਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਕਿਲੇ ਕਾ ਕਰਨ ਕਿਰਾਰ ਕਰੋ।

சில்டர்

சல்ஃபர் 80% டப்ளியூடீஜி

(சல்பர் சிலிஸ்டிஜ் கலவை)

இது 80% சல்ஃபரு மற்றும் 20% ஒன்றுபடுவிகளால் மற்றும் மணல் மணமுள்ள சூள்ள 20% மற்றும்/அல்லது கலவையாகவிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயன்கள்

கிடைக்கும் பயன்	பயிரின் பெயர்	அளவு/ஏக்கர் (கிராம்) ஏக்கர் (மிலி)	கலவை/ லிட்டர் கலவை (மிலி)	(லிட்டர்)	கலவையை கலக்கும் அளவு/ஏக்கர் (மிலி)
பருத்தி	பவுடரி மில்டியூ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
சோளம்	பவுடரி மில்டியூ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
அவரைக் காய்	பவுடரி மில்டியூ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
பீச்					
பாதாம்					
பீச்சிங்	பவுடரி மில்டியூ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
ஆப்பிள்	பவுடரி மில்டியூ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
பட்டாணி	பவுடரி மில்டியூ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	
மிளகு	பவுடரி மில்டியூ	1.50-2.00	1.875-2.50	750-1000	

வரிசைப்படுத்தும் வழிமுறை : சல்பர் அடிப்படையிலான "கருப்பு" பைரிக்கள் தூளிட்டவை, ஆப்பிள், பேரிக்காய் மற்றும் இதர பழங்களில், சப்பாத் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள அளவு உடன் வெப்பநிலை (85 °F-மாதாதி, அல்லது 30 சி) நிலவும் இடங்களில் வைரஸ்டோடைக்கிக்கு.

பயிர் பாதுகாப்பு உபகரணம்: தூளாக்கப்பட்டுள்ள, ஃபுட் ஸ்प्रேயர், ஃபுட் ஸ்प्रேயர், மோட் ஹைட்ராலிக் ஸ்प्रேயர்கள் மற்றும் ஸ்प्रேயர்கள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உலர்ப்பொருட்கள், காய்கள் உலர்ப்பொருள் மொச்சைகள் மற்றும் விவசாயிகள் உலைகளிலிருந்து தூரத்தில் வைக்கவும். 2. காய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தொடர்பை தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு பணியை வலாரியது, காற்று வீசும் திசையில் தெளிப்பது ஆபிலைகளை தவிர்க்கவும். 4. தெளித்த பின்னர் ஊடட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பகுதிகளை நன்றாக கழுவவும். 5. தெளிக்கும்போது பாலிபிளீன், சாப்பிடுவோ அல்லது எதையும் வாய்க்கு வைக்கக்கூடாது. 6. வலக்கும் போது மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும்.

பயிர்களுக்கு நச்சுத்தன்மை: வயிர் பிளாக்ஸாச் படுபவர்களுக்கு பொருத்து இது பயிர்களுக்கு நச்சுத்தன்மை அடையக்கூடியது.

விஷயியிருக்குமான அறிகுறி: குமட்டல், வாந்தி, தலைவலி மற்றும் நெஞ்சு கண்கள் மற்றும் தோலில் எரிச்சல் ஏற்படும்.

முதலுதவி: 1. உட்கொண்டு சுருக்கம் தொண்டை பகுதி செயல்களில் கிளர்ச்சி ஏற்படாமல் எதுவும் வைக்கவும். வாந்தி முழுவதும் நிறுத்தும் வரை இதை தொடர்ந்து செய்யவும். 2. ஆடைகள் மற்றும் சருமம் பாதிப்பேற்றுதாரர் ஆடைகளை அகற்றி மற்றும் பாதிப்பட்ட சருமத்தை போதுமான அளவு சோப் மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 3. கண்ணை பாதிப்பேற்றுதாரர் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை போதுமான அளவுக்கு வெந்நீர்/தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 4. உட்கொண்டுவந்தால் நோயாளியை சுத்த காற்று உள்ள இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும்

கவனி வைத்து: குறிப்பிட்ட எதிர்வினைகளை மற்றும் தெரியவில்லை அறிகுறிகளுக்கு ஏற்கனவே செய்யவும்

பயன்படுத்திய கொள்கலன்கள் அப்புறப்படுத்துதல் : 1. காலி கொள்கலன்கள் பயன்படுத்த குடிநீருடன் மற்றொரு அப்பாவி முறைகள் வேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையாக செய்யவே விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பேரிக்காய் அல்லது எதுவிய மரத்தை மற்றும் கழுவிய தண்ணீர் கழுவுபாய மற்றும் தண்ணீர் பாயிங்களைத்தெளிக்கும்வகையில்லாமல்பாசனப்பயன்படுத்த வேண்டும்.

சேமித்து வைக்கும் நிலைகள் : 1. பழுது உள்ள பேரிக்காய்கள் மற்றும் பொருட்களை குறிப்பாக உணவுப்பொருட்களை வைக்கும் அல்லது கட்டிடங்களிலிருந்து அப்பால் தனியான அல்லது அல்லது கட்டிடங்களிலிருந்து அல்ல மற்றும் தங்கியை பொருத்து தனியான பூட்டக்கூடிய அலமாரியில் வைக்க வேண்டும். 2. ஆபிலாபங்களில் பாயிலுக்கு தனியான மற்றவை சிறந்த வைப்பு அல்லது கட்டிடங்கள் அல்லது கட்டிடப் அல்ல வெள்ளம் மற்றும் காற்றோட்டம் ஒரு மற்றும் பொருளாக பரிமாறப் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

கலப்பு ஏஜ

பாயப்படுத்தியுடைட		80.000% w/w
	பிளேக் கல்பியன்கிட்ரூட்:	80.000% w/w
	கன்ட்டிக்கேட்	
	சோடியம்கார்ட்	
வெட்டியஎஜெட்அமைவுதாப்பிவிளைவுபோன்ற		2.000% w/w
	மற்றும்அமோனியாட்ரூட்	
	கன்ட்டிக்கேஷன்	
	சோடியம்கார்ட்	
கீளாஸ்மியன் / கலப்பின		100 ஆக்கூறுகள்
மொத்தம்		100.000% w/w

முன்னெச்சரிக்கை : இது தூண்டுதலுக்கு ஏற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தப்படாது. குறிப்பிட்ட பயிர்களை தவிர்

For Agricultural Use Only

केवल कृषि उपयोग के लिए।

Read Leaflet Before Use

पूरा पर्चा और लेबल ध्यान से पढ़े

Sulphur 80%WDG

Siltor

Contact Fungicide

सल्फर 80% डब्ल्यू.डी.जी.

सिलटौर

स्पर्शीय फफूंदीनाशक

Godrej agrovet

Marketed By :

Godrej Agrovet Limited

"Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar,
Eastern Express Highway,Vikhroli (East),
Mumbai - 400 079

विपणनकर्ता : गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड,
"गोदरेज वन", तीसरा माला, पिरोजशा नगर,
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विकरोली (पूर्व), मुम्बई–400 079

Customer Care No: 022-25194491

e-mail: gavtho@godrejagrovet.com

www.godrejagrovet.com

Manufactured By:

Crop Growth (India) Pvt. Ltd.

D-21 & C-21,22, Sikandrabad Industrial Area,
Dist. Bulandshahr-203 205 (U.P.)

निर्यात : क्रॉप ग्रोथ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,
डी–२१ एण्ड सी–२१,२२, सिकन्दराबाद इंडस्ट्रीयल एरिया,
जिला बुलन्दशहर–२०३ २०५ (यू.पी.)